

CARACTERISTICAS GENERALES

FITHOR-VIT®

Concentrado Hormonal

REGULADOR DE CRECIMIENTO



POLVO SOLUBLE

COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA

p/p

ACIDO NAFTALENACETICO (C ₁₀ H ₇ CH ₂ CO ₂ H)	0,50 %
ACIDO GIBERELICO (C ₁₉ H ₂₂ O ₆)	0,25 %
ACIDO INDOLBUTIRICO (C ₁₂ H ₁₃ NO ₂)	0,10 %
ACIDO ACETILSALICILICO (C ₉ H ₈ O ₄)	0,10 %
VITAMINAS B1	0,10 %
VITAMINAS C	0,15 %
INGREDIENTES INERTE	98,80 %

Equivalente a 120 gr de i.a. por kilo de producto

USO AGRÍCOLA

“NO ALMACENE EN EL HOGAR, MANTENGASE EN UN LUGAR CERRADO Y FRESCO,
ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS,
MANTENGASE EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y BIEN CERRADO”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA”

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVARLOS CON ABUNDANTE AGUA FRESCA Y SI EL CONTACTO FUESE CON LA PIEL LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN”

Teléfonos de emergencia la 24 horas: INTOXICACIONES 0-800-TOXICOS/0800-(8694267). 0212-6811515/1717-6820610. O A CISPROQUIM (0800-1005012). LINEA DE SERVICIOS BEMIAGRO C.A. 0253-4913197.

**HECHO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FITHOR-VIT
 Concentrado Hormonal
REGULADOR DE CRECIMIENTO

FITHOR-VIT

Concentrado Hormonal
REGULADOR DE CRECIMIENTO

FITHOR-VIT: Es un regulador de crecimiento que actúa como promotor de la planta contribuyendo en la activación del desarrollo vegetativo de los brotes, agrandamiento y multiplicación de las células. Actúa induciendo la floración, alargamiento del tallo, enraizamiento, cuajado y engruese de frutos. Produce ruptura de la latencia en semillas. Inhibe la caída de flores y por consiguiente aumenta el número de frutos. Retarda o acelera (dependiendo de las dosis usadas) la maduración de frutos sin cambiar la calidad de estos. En especial lo relacionado con contenido de carbohidratos y azúcares. **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

PRESENTACION:

- FRASCO DE 40 Gr.
- BOLSA DE 1 KILO

¿PORQUE USAR FITHOR-VIT?

FITHOR-VIT Induce la floración, alargamiento de tallos, enraizamiento, cuajado y engruese de frutos, aumenta el número de estos, retarda o acelera dependiendo de las dosis aplicadas la maduración de los frutos sin cambiar la calidad, en especial lo relacionado con el contenido de azucares y carbohidratos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	BENEFICIO	Dosis/ha
PLATANOS, ARROZ, MAIZ Y CAÑA DE AZUCAR	Incremento en los rendimientos y tallos	80-160 grs
DURAZNO, ALBARICOQUE, MELOCOTON, CIRUELAS	Incremento en los rendimientos	160 grs
CEBOLLA, AJO Y ZANAHORIA	Incremento en los rendimientos	80-160 grs
PAPA, TOMATE, PIMENTON Y TABACO	Rompimiento de latencia, enraizamiento e incremento en los rendimientos	80-160 grs
CACAO, GUAYABA, CITRICOS Y FRUTALES EN GENERAL	Incremento en los rendimientos	80-160 grs
MANZANO Y PERALES	Incremento en los rendimientos	80-160 grs
HORTALIZAS EN GENERAL, BERENJENA, APIO, LECHUGA, BROCOLI, COLIFLOR, REPOLLO.	Incremento en los rendimientos	80-160 grs
FRESAS, ROSAS, POMPOM, CRISANTEMO, ALGODÓN Y PEPINO	Incremento en los rendimientos, alargamientos de tallos y floración.	160 grs
VID	Floración e incremento en los rendimientos	80-160 grs

NOTA: Deben respetarse las dosis recomendadas, La empresa Fabricante NO se Hace responsable por el mal uso o manipulación del producto.

Impulsando El Agro Venezolano

Formulación, Fabricación y Distribución de Fungicidas Insecticidas y Fertilizantes Foliare, líquidos e hidrosolubles

FITHOR-VIT Concentrado Hormonal **REGULADOR DE CRECIMIENTO**

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

De acuerdo a sus características de acción FITHOR-VIT se debe aplicar dependiendo del cultivo, utilizando las dosis señaladas anteriormente. **Última aplicación antes de la cosecha: 15 días. Modo de acción: Sistémico**

METODO DE EMPLEO POR CULTIVO: Para todos los cultivos se puede aplicar con asperjadora de espalda, motor, tractor y avioneta. Las dosis van de acuerdo a la necesidad y fase del cultivo.

COMPATIBILIDAD: Con la mayoría de plaguicidas. NO mezclar con sustancias fuertemente alcalinas.

FITOTOXICIDAD: Según su formulación no se ha observado.

TOLERANCIA: Tomate, Café, Cacao, Papa, Pimentón Manzanas, Duraznos, Cítricos, Plátanos, Cambures, Fresas, Zanahoria, Remolacha, Vid, (200ppm).

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO : Es un compuesto totalmente soluble en agua, que se mezcla para ser aplicado al follaje o raíz en cualquier estadio de la planta (Vegetativo, Reproductivo).

Para aplicaciones aéreas de 200grs/Vuelo y para aplicaciones con asperjadora de espalda, motor y tractor aplicar de 80 a 160grs/ha. Las dosis van de 40 a 80 grs por 200 litros de agua.

RECOMENDACIONES DE USO: Indicado ampliamente para la mayoría de cultivos agrícolas; Hortalizas, frutales, flores, cereales, leguminosas, musáceas etc...

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES:

- Use equipo de protección adecuado (botas, guantes, mascara, camisa manga larga).
- Evite el contacto con la piel y los ojos, en caso de hacerlo lavarse con abundante agua.
- No coma ni beba ni fume durante la aplicación del producto.
- Aplique el producto a favor del viento, con equipo de aspersión calibrado.
- Bañarse con abundante agua y jabón después de la aplicación.

FITHOR-VIT: Es un concentrado sólido elaborado con ingredientes hormonales básicos y vitaminas de la más alta calidad, como reactivador enzimático y fisiológico de las plantas para obtener mayores y mejores rendimientos en las cosechas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las descritas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIONES DE USO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: No ingerir el producto ni el caldo preparado. Preparar la solución en un lugar abierto y ventilado, alejado de casas y fuentes de agua. Evitar la inhalación. Para la preparación y aplicación utilizar la vestimenta adecuada: camisa de manga larga, pantalón largo, botas y guantes plásticos, lentes protectores, sombrero y mascarara. Evitar que el producto o caldo caiga sobre la persona que lo manipula, trabajar a favor del viento y no en contra. Utilizar equipos en buen estado y calibrados. No limpiar las boquillas tapadas soplándolas, sino con brocha de cerdas suaves. No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Terminada la aplicación lavar bien el equipo evitando que el resto del caldo y lavado caiga sobre fuentes de agua. Lavarse bien las manos y la cara con abundante agua y jabón.

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de Mezcla y Aplicación, Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usado el producto cámbiese, lave la ropa contaminada separada del resto de la ropa, usando guantes protectores. Báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

MANEJO DE ENVASE: DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, ENJUÁGUELO TRES (3) VECES CON AGUA Y VIERTA LA SOLUCIÓN AL TANQUE DE ASPERSIÓN MIENTRAS ES LLENADO. LUEGO INUTILICE EL ENVASE TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y ALMACÉNELO EN UN LUGAR SEGURO. NO REUTILICE ESTE ENVASE



Impulsando El Agro Venezolano

Formulación, Fabricación y Distribución de Fungicidas Insecticidas y Fertilizantes Foliare, líquidos e hidrosolubles

ALMACENAMIENTO: No almacenar ni transportar el producto junto con bebidas, alimentos, ropa, semilla, medicina u otros productos de uso humano o veterinario. Manténgase bajo llave en su envase original etiquetado y cerrado, en un lugar seco y ventilado a temperaturas no mayores a 30 °C.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: Si es ingerido no induzca el vómito. No administre tratamiento oral si la persona esta inconsciente. Trasladar al afectado al médico más cercano. En caso de inhalación: retire al paciente a un lugar bien aireado y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos: lávese bien con abundante agua. Consulte al médico en caso de irritación consulte al médico.



FITHOR-VIT®
Concentrado Foliar
REGULADOR DE CRECIMIENTO
MULTIACCIONES

www.bemiagro.com

REDES: [f Bemiagro.CA](https://www.facebook.com/Bemiagro.CA) [@bemiagroca](https://www.instagram.com/bemiagroca) [tiktok bemiagroca](https://www.tiktok.com/@bemiagroca)

Bemiagro c.a.